ABRÉVIATIONS LES PLUS USUELLES

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	PROVENANCE DU LATIN/ COMMENTAIRE
A		
A.A.A.	anévrisme de l'aorte abdominale	
a.c.	avant les repas	ante cibum
ad lib	à volonté	ad libitum
ad	jusqu'à	
Abd	abdomen	
Ag	antigène OU argent	Ag utilisé plus fréquemment pour argent
agit	agiter	agita
AM	avant-midi	
Amb.	ambulatoire	
Amp.	ampoule	
Ant.	antérieur	
ATCD	antécédent	
AVC	accident vasculaire cérébral	
AVD	activités de la vie domestique	
AVQ	activités de la vie quotidienne	
ax	axillaire	
B		
BCM	bilan comparatif des médicaments	
b.i.d.	2x par jour	bis in die
BPOC	bronchopneumopathie	
bucc.	buccal	
Batt.	battement	
C		
ċ	avec	cum
°C	degré celsius	
C1, C2, C3	vertèbres cervicales	
caps.	capsule	capsula
c.à t.	cuillère à thé	
c.à tble	cuillère à table	
CCMSP	couleur, chaleur, mobilité, sensibilité, pouls	

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	PROVENANCE DU LATIN/ COMMENTAIRE
Cl	chlore	
Chx	chirurgie	
cm	centimètre	
co.	comprimé	
D		
D1, D2, D3	vertèbres dorsales	
dlr	douleur	
DRS	douleur rétro sternale	
drt	droit	
Dx	diagnostic	
die	chaque jour	
E		
el.	élixir	
ECG	électrocardiogramme	
EEG	électroencéphalogramme	
exp.	expiration	
F		
FADM	feuille d'administration des médicaments	
FC	fréquence cardiaque	
Fe	fer	
FR	fréquence respiratoire	
F.S.C.	formule sanguine complète	
Fx	fracture	
G		
g	gramme	
gche	gauche	
g.i.	gastro-intestinal	
gtt	goutte	gutta
g.u.	génito urinaire	
GVO	garder veine ouverte	
H		
h	heure	hora
H.T.A.	hypertension artérielle	

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	PROVENANCE DU LATIN/ COMMENTAIRE
H₂O	eau	
Hb	hémoglobine	
Ht	hématocrite	
h.s.	au coucher	hora somni
I		
ICT	ischémie cérébral transitoire	
I.D.	intra dermique	
idem	même/ pareil	
I/E	ingérés et excrétés	Ingesta/excreta
Inj.	injection	
I.M.	intra musculaire	
IMC	indice de masse corporelle	
IR ou I/R	intra-rectal	
irr.	irrégulier	
Irrig.	irrigation	
ITS	infection transmise sexuellement	
I.V.	intraveineuse	
I.V.R.S.	infection voies respiratoires supérieures	
J		
Jr	jour	
K		
K	potassium	
KCl	chlorure de potassium	
Kg	kilogramme	
L		
l ou L	litre	
L1, L2, L3	vertèbres lombaires	
L.C.R.	liquide céphalo-rachidien	
Liq.	liquide	
M		
mcg	microgramme	
MEC	mise en charge	
mEq	milliéquivalent	

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	PROVENANCE DU LATIN/ COMMENTAIRE
m. & n.	matin et soir	mane et nocte
mg	milligramme	
M.I.	membre inférieur	
Min.	minute	
ml	millilitre	
mmol	millimole	
M.P.O.C.	maladie pulmonaire obstructive chronique	
M.S.	membre supérieur	
N		
n	rien	nil
Na	sodium	
NaCl	chlorure de sodium	
neg.	négatif	
Nil	aucun-rien	
no	numéro	numerus
non rep.	ne pas répéter	non repetatur
NPO	rien par la bouche	Nil per os
O		
O²	oxygène	
OAP	œdème aigu du poumon	
omn. hor.	toutes les heures	omni hora
omn. m.	tous les matins	omni mane
omn. n.	tous les soirs	omni nocte
Opht.	ophtalmique	
ORL	oto-rhino-laryngologie	
O.T.	ordre téléphonique	
O.V.	ordre verbal	
P		
P ou pls	pouls	
P.A.	pression artérielle	
pans.	pansement	
p.c.	après les repas	post cibum
pH	potentiel d'hydrogène	

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	PROVENANCE DU LATIN/ COMMENTAIRE
pil.	pilule	pilula
PM	après-midi	
p.o.	par la bouche	per os
Post-op ou postop	post opératoire	
préméd.	pré médication	
pré-op. ou préop	pré opératoire	
péri	autour	
p.r.n.	au besoin	pro re nata
PTI	plan thérapeutique infirmier	
PV	ponction veineuse	
Q		
q.3 h	toutes les 3 heures	quaque tertia hora Le chiffre pourrait être remplacé selon le temps prévu
q.i.d.	4 fois par jour	quatuor in die
q.q.hor.	chaque heure	quaque hora
qqn	quelqu'un	
QSED	quadrant supéro externe droit	
QSEG	quadrant supéro externe gauche	
R		
R.A.S	rien à signaler	
Resp.	respiration	
Rect.	rectal	
Rég.	régulier	
Rh	facteur rhésus	
RV	rendez-vous	
Rx	radiographie ou médicament	Selon le contexte
S		
ŝ	symptôme	
S ou sec.	seconde	
Sat.	saturation	
S.C.	sous cutané	
s/l	sublingual	
SpO²	saturation pulsée en oxygène	

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	PROVENANCE DU LATIN/ COMMENTAIRE
Supp.	suppositoire	
Susp.	suspension	
S.V.	signes vitaux	
SNC	système nerveux central	
SNV	signes neurovasculaires	
stat	immédiatement	statim
T		
tél.	téléphone	
Temp. T°	température	
t.i.d.	3x par jour	ter in die
tjrs	toujours	
TNG	tube nasogastrique	
TVO	tenir veine ouverte	
U		
ung.	onguent	unguentum
UI	unité internationale	
V		
Vol.	volume	

Ceci n'est pas une liste exhaustive des abréviations utilisées. De plus, il pourrait arriver que le milieu ne respecte pas les majuscules, minuscules ou les points à être utilisés selon les règles de la langue française.

L'abréviation est la forme réduite d'un mot résultant du retranchement d'une partie des lettres de ce mot.

- On supprime les lettres finales, toujours devant une voyelle. L'abréviation prend le point abrégatif, car sa dernière lettre n'est pas celle du mot entier.
- On supprime les lettres à l'intérieur du mot, surtout des voyelles. L'abréviation ne prend pas le point abrégatif, car sa dernière lettre est celle du mot entier.

Prenez note que certaines abréviations n'apparaissent pas dans cette liste puisque l'*Institut pour une utilisation sécuritaire des médicaments du Canada* (ISMP) demande l'élimination de l'utilisation d'abréviation, sigles ou symboles pouvant portés à confusion. Il est suggéré de consulter le site suivant :

www-ismp-canada.org